

Dépistage du cancer du sein : Marisol Touraine lance Octobre rose 2014.
[Lire la suite](#)



PRODUITS

Hyperactivité vésicale
Du nouveau pour vos patients



[Lire l'article](#) [Mentions légales](#)

Toviaz® est indiqué dans le traitement symptomatique de la pollakiurie et/ou de l'impériosité urinaire et/ou de l'incontinence urinaire par impériosité pouvant s'observer chez les patients adultes souffrant d'hyperactivité vésicale.⁽¹⁾



Remise à disposition de la spécialité STAGID® 700 mg, comprimé sécable.
[Lire la suite](#)

ETUDES ET SUIVI ÉPIDÉMIO

Accessibilité et accès aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2011. [Lire la suite](#)

CGM & moi

AxiSanté, les Formations de la Rentrée
[Lire l'article](#)

Toutes les formations 2014
[Lire l'article](#)


HYPERACTIVITE VESICALE

Toviaz® est indiqué dans le traitement symptomatique de la pollakiurie et/ou de l'impériosité urinaire et/ou de l'incontinence urinaire par impériosité pouvant s'observer chez les patients adultes souffrant d'hyperactivité vésicale.⁽¹⁾

NOUVEAU



Comment prescrire Toviaz®.



Mode d'administration



Les comprimés doivent être pris **une fois par jour** avec une boisson, et avalés entiers⁽¹⁾

Remboursement Sécurité Sociale : 30%⁽²⁾



Boîte de 30 comprimés à libération prolongée
 Prix public TTC : 30,64 €
 CTI : 1,02 €

Boîte de 30 comprimés à libération prolongée
 Prix public TTC : 30,64 €
 CTI : 1,02 €

[Mentions légales](#)

[En savoir + \(Etude Chapple\)](#)

[Voir le spot animé](#)

ΔPour plus d'information sur la posologie, veuillez vous reporter au RCP de Toviaz®

* La dose initiale recommandée est de 4 mg une fois par jour. Selon la réponse individuelle, la dose pourra être augmentée à 8 mg une fois par jour. La dose maximale journalière est de 8 mg. L'effet optimal du traitement a été observé après 2 à 8 semaines. Par conséquent, il est recommandé de réévaluer individuellement l'efficacité chez les patients après 8 semaines de traitement.†

†Chez les sujets ayant une fonction hépatique et une fonction rénale normales et recevant de façon concomitante des inhibiteurs puissants du CYP3A4, la dose maximale journalière de Toviaz® est de 4 mg une fois par jour.Δ

1. Résumé des caractéristiques du produit Toviaz®.
2. Journal Officiel de la République Française du 07/03/14

Visa N° : 13201/6847/6537/PM/024-v1 - TOVIV 047 - Tous droits réservés 2013 © Pfizer SAS au capital de 39 200 euros. RCS Paris 433 623 550 - Locataire géant de Pfizer Holding France